

消化内镜 服务手册

Endoscopy Center

电话：40001-95522转6

地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道3099号
深圳前海泰康医院门诊4楼消化内镜中心

消化病学诊疗中心



深圳前海泰康医院消化病学中心是泰康医疗的战略型重点学科，由我国著名消化病学专家、第十一届中华医学会消化病学分会主任委员陈旻湖院长领衔，汇聚消化内科陈其奎教授、消化内镜李初俊教授、肝胆外科周杰教授、消化病理焦宇飞教授等知名专家，打造多学科协作、特色化、医教研一体的消化疾病诊疗中心。

中心在对常见消化系统疾病的诊断和治疗基础上，协作各科室重点发展炎症性肠病（IBD）全病程管理、胃肠道疾病内镜治疗、肝胆胰腺疾病诊治、消化系统常见肿瘤早筛早治、胃肠道肿瘤微创治疗、肠道菌群检测与菌群移植等特色诊疗项目。

ENDOSCOPY CENTER

深圳前海泰康医院

消化内镜



我们专注于消化内镜专业诊疗服务，致力于为客户提供高质量、全方位的健康医疗保障。中心配备了国际领先的奥林巴斯290、富士6000、以及一次性胃肠镜设备。开展无痛胃镜、肠镜、超声内镜、小肠镜等多种内镜检查和治疗手段。

我们以“提供安全、专业、舒适的高品质内镜诊疗”为宗旨，通过高效的流程和便捷的服务，为客户提供无忧的内镜诊疗。



关于舒适内镜

内镜中心提供多种无痛内镜技术，麻醉由专业麻醉师负责，确保整个检查过程中的舒适无痛。注重隐私和舒适，从温馨的候诊环境到个性化的服务，确保客户在整个就诊过程中的舒适体验。

为什么选择我们？

- ✓ 先进的内镜设备
- ✓ 方便快捷的预约渠道和周期
- ✓ 舒适的诊疗环境
- ✓ 遵循国际标准的消毒和感染控制流程
- ✓ 资深的消化内镜、麻醉、病理多学科团队

目录

① 什么是胃镜和肠镜？	1
② 消化内镜医生简介	2
③ 胃肠镜预约流程	3
④ 预约就诊须知	4
⑤ 胃肠镜检查须知	6
⑥ 您的内镜之旅	10
⑦ 检查后注意事项	11
⑧ 如何联系我们	13

什么是胃镜和肠镜？

1.胃镜：

医生将使用一个被称为内窥镜的细软管从口腔进入,它带有自备的镜头和光源,医生可以在视频显示器上观看实时的图像来检查您消化道上部的内壁,包括食管、胃和十二指肠(小肠的第一部分)。

胃镜检查的目的：

胃镜检查帮助您的医生评估上腹部疼痛、恶心、呕吐或吞咽困难等症症状。这是寻找上消化道出血原因的最好的检查方法。它比X光片能更准确地发现食管、胃和十二指肠中的炎症、溃疡和肿瘤。您的医生可能利用胃镜检查获取活检样本(小块组织样本)来明确诊断。

2.肠镜：

内窥镜原理同胃镜，肠镜从肛门进入，是另一条干净的内窥镜。从肛门进入后，再慢慢进入直肠和结肠部分，医生将对您的整个大肠内壁进行观察。

肠镜检查的目的：

结肠镜检查可以被推荐作为大肠癌筛查的一个项目。近年来,随着中国生活水平的提升和饮食习惯的西化,结直肠癌的发病率呈现上升趋势,已成为消化系统中发病率第二位、患病率第一位的恶性肿瘤。通过早期筛查和干预,可以显著降低发病率和死亡率。您的医生也可能推荐结肠镜检查用于评估出血、慢性腹泻等症状。

活检示例图



消化内镜医生简介



李初俊-消化内镜首席专家

出诊时间：周二下午（专家门诊）、周三下午（国疗门诊）

个人简介：长期从事临床工作，对消化系统疾病，包括食管、胃肠以及肝胆、胰腺疾患的临床和消化内镜下的诊断与治疗具有丰富的经验。曾创立并历任中山大学附属第六医院消化内镜科主任、消化内科主任和诊疗学教研室主任；曾于香港中文大学研修现代治疗内镜，近20多年来专注于消化内镜工作，消化内镜诊疗技术全面，娴熟地操作各种消化内镜(包括胃镜、肠镜、小肠镜、十二指肠镜、超声内镜、无线/胶囊内镜)进行各种消化内镜诊断，并擅长于不需开胸、开腹手术的各种消化内镜下的超微创治疗，包括消化道息肉、胃肠道黏膜下肿瘤、早期消化道癌、消化道出血、内痔、贲门失弛缓等消化道狭窄或梗阻性病变、胆总管结石、阑尾结石的超微创治疗、各种消化道支架和胆胰管支架的置放、超声内镜引导下的穿刺活检及引流等，于有效治疗的同时，最大限度减少治疗创伤。

擅长：胃肠息肉、胃肠道黏膜下肿瘤、早期消化道癌、消化道出血、内痔、消化道或胆胰管狭窄或梗阻、贲门失弛缓症、胆总管结石、胰腺假性囊肿、阑尾炎/阑尾结石。



王琛-消化内科主任医师

出诊时间：周一下午（专家门诊）、周四下午（专科门诊）

个人简介：内蒙古医科大学消化内科硕士,长期研究消化系统疾病饮食与生活指导。获市级科技进步奖三等奖,参与发表SCI论文9篇，论著1部。参与省级科研课题6项。拥有17年临床诊疗经验，多次赴国内外顶尖医疗机构深造消化内科及消化内镜技术，完成全科医师培训及精神心理科转岗培训，参与多项肠道微生态研究项目。

擅长：功能性便秘、腹泻、肠易激综合征（IBS）及肠道菌群失调引发的免疫疾病等消化疾病诊治，及超声内镜、胃肠镜早癌筛查、消化道息肉内镜下微创治疗。致致力于探索肠-脑-免疫轴在消化道疾病、过敏性疾病中的作用，擅长结合多学科视角开展综合诊疗。



孙廷基-消化内科主治医师

出诊时间：周三下午（专科门诊）

个人简介：长期从事消化内镜诊疗与研究，可完成消化道早期肿瘤内镜下诊断及切除治疗、消化道息肉的内镜下切除，急性消化道出血内镜下治疗、消化道异物取出术、超声内镜检查等内镜技术；曾在上海长海医院、中山大学附属第一医院进修内镜技术。

擅长：慢性胃炎诊断及治疗、消化道息肉内镜下切除、消化道早期肿瘤内镜下切除、急性消化道出血（包括静脉曲张性及非静脉曲张性）内镜下治疗、消化道异物取出、胆胰相关疾病。

消化内镜预约流程（门诊）

**适用于非国际部客户*

1.消化内科门诊

门诊2楼：内外科综合门诊/专家门诊

**途径：医院公众号 或 自助缴费机*



2.麻醉门诊

门诊4楼：麻醉评估门诊

**如预约普通胃肠镜，请缴费后直接前往内镜中心*
**非工作日工作时间仅提供线上麻醉预评估服务。由于线上评估存在一定局限性，无法替代现场评估，因此最终能否接受无痛检查仍需以检查当天的现场评估结果为准。*



3.缴费

**途径：医院公众号或自助缴费机*
**共两笔费用：胃肠镜相关费用，麻醉相关费用（如为普通胃肠镜，则无需麻醉费用）*
**费用详情请参考第4页*



4.取药

门诊4楼：内镜中心

**提供胃肠镜健康宣教及预约咨询。*



预约就诊须知

如您有以下情况，请在预约时及时告知医生

- 有心脏起搏器
- 有植入式心脏除颤器
- 长期服用抗血小板药物或抗凝药物如阿司匹林、氯吡格雷（波立维）、华法林等
- 长期便秘
- 有造口
- 怀孕或可能怀孕

- 1.不接受指定检查医生，若需指定医生，请到该医生门诊挂号时与医生本人沟通安排。
- 2.如同时预约腹部B超、影像检查，请完成检查后再行胃肠镜检查。如同时预约钡餐造影，则胃镜检查需推迟3天。
- 3.为了保障检查安全，强烈建议患者本人按预约流程亲自前来完成麻醉评估后再取药。若由他人代为取药，可能导致“先服药、后评估”的情况，存在肠道已准备好但麻醉评估未通过、无法进行无痛检查的风险。尽管目前已提供线上麻醉预评估服务，但医生无法通过远程方式进行面诊、听诊及结合部分辅助检查（如心电图、心脏彩超、24小时睡眠呼吸监测等）做出完整判断。最终是否符合无痛内镜检查条件，仍需以现场麻醉评估为准。
- 4.若麻醉评估未通过，将无法安排无痛检查，需根据具体情况改约检查时间、退费或改为清醒内镜检查，敬请理解与配合。
- 5.如有商保或其他保险涉及报销，请提前告知所需资料，请就诊时与医生说明。
- 6.本院仅提供病历、清单及发票，若有保单涉及到其他额外的资料，请您先与保险公司确定所需的资料，在就诊时进行说明。
- 7.我院已获取医保定点资质，门诊和住院均支持使用医保。异地医保报销比例按参保地政策执行，详情可咨询参保地医保局。
- 8.胃肠镜检查费用*（按照深圳医保定价收费，具体价格以医院公示为准，仅供参考）

检查项目	费用（检查费加药品）
普通胃肠镜	800~1000元
麻醉胃肠镜	1200~1600元

所列费用仅检查费及检查用常规药品，不包含**看诊的挂号费以及检查过程中所做的活检或者治疗（如息肉切除等）所产生的治疗费、耗材费及病理费（费用详情请参考第8页）。*

根据医生评估个人情况用药可能有所不同，或有特殊用药情况，费用将会在此基础上有波动。

**适用于非国际部客户*

9. 风险告知

任何医疗行为都存在一定的风险，消化内镜检查与治疗是一种侵入人体的检查与治疗方法，在检查与治疗过程中可能会对人體带来一定的损伤，麻醉同样如此，尤其对于伴有基础疾病或高龄患者而言，以下是关于消化内镜和麻醉的风险告知，检查前会请您签署知情同意书，请您知晓了解。

消化内镜检查风险告知

I .消化内镜检查及内镜下治疗有一定的创伤性和危险性,在实施过程中/后可能出现下列并发症和风险:

- (1)咽喉不适或损伤
- (2)恶心呕吐
- (3)原松动牙齿脱落
- (4)腹痛
- (5)腹胀
- (6)诱发出血或原出血加重
- (7)穿孔
- (8)虚脱、低血糖
- (9)原有肠梗阻加重
- (10)在肠道准备过程中发生水、电解质紊乱
- (11)诱发急性心血管意外:包括急性心律失常、急性心肌梗死
- (12)诱发脑血管意外
- (13)治疗时病灶附近脏器损伤
- (14)检查及(或)治疗失败
- (15)感染
- (16)诱发高淀粉酶血症或急性胰腺炎等
- (17)其他

II .如果患有高血压、心脏病、糖尿病、肝肾功能不全、静脉血栓等疾病或者有吸烟史以上这些风险可能会加大,或者在检查中或检查后出现相关的病情加重或心脑血管意外,甚至死亡。

麻醉风险告知

- (1)根据麻醉操作规范、按照《中华人民共和国药典》的要求,使用各种、各类麻醉药后,患者仍有可能出现中毒、过敏、高敏、神经毒性等反应,导致休克、呼吸心跳停止。
- (2)全麻时,特别是对急症饱胃患者,麻醉前已经采取力所能及的预防措施,但仍不能完全避免发生呕吐、反流误吸,甚至窒息死亡。
- (3)全身麻醉可引起喉或支气管痉挛、呼吸道梗阻、呼吸抑制等。
- (4)麻醉过程中,有可能出现心脑血管系统并发症:血压异常波动、心律失常、心力衰竭和休克等。
- (5)气管插管、喉罩置入过程中,虽按常规操作,仍可能发生牙齿脱落,口、鼻、唇、咽喉部损伤,气道痉挛等不良后果。
- (6)患者本身合并其他疾病或有重要脏器损害者,相关并发症和麻醉危险性显著增加。
- (7)常规检查和治疗可能引起的并发症。
- (8)其它


胃肠镜检查须知

1.饮食准备： 【检查前一日】



低纤维的食物

- ✓ 白面包、白粥、白米饭
- ✓ 猪肉、鱼肉、鸡肉
- ✓ 鸡蛋、豆腐





高纤维、带籽的食物

- ✗ 坚果、爆米花、藜麦、燕麦、全麦食物
- ✗ 西瓜、猕猴桃、火龙果、西红柿等
- ✗ 青菜、菠萝、韭菜、竹笋



【检查前最后一餐】
建议清流质饮食,如:
无渣鲜果汁(柠檬汁、梨汁、苹果汁)、煮水果汁/米汤、稀藕粉、稀面汤/无渣肉汤、鸡汤、鱼汤/ 过滤菜汤等

2.禁食禁饮的时间要求

禁食至少6小时，禁饮至少2小时，请严格按照医护人员指导进行
(如有胃排空相关疾病或影响因素可能会增加禁食禁饮时间，以医生建议为准)
常规情况下：
早上检查者会要求您前一日晚餐后（八点）开始禁食
下午检查者会要求您检查当日早餐后（七点）开始禁食

3.特殊药物注意

抗凝、抗血小板及活血化瘀药物：请在医生指导下停用，常规停用5-7天
降压药：检查当天，请在医生指导下服用✓
降糖药：检查当天，请在医生指导下停用✗

4.泻药服用方法



目前本院使用的泻药有两种（下图），根据医生所开药品，您会得到相对应的指导，请严格遵守医护人员所宣教的内容，若有特殊情况：如严格遵守喝药方法后排便情况依旧不理想，请及时联系检查部门进行说明以及得到指导，但您的检查时间可能会有改动。

泻药1：聚乙二醇电解质散

泻药2：硫酸镁钠钾浓溶液

6

泻药服用方法：聚乙二醇电解质散

第一袋药品服用时间：	检查前6小时服用，每隔15分钟喝250ml，1小时内饮完1000ml	 每一袋聚乙二醇电解质散都要配置1000ml水饮用，或可选择兑脉动等无色澄清透明液体
第二袋药品服用时间：	检查前5小时服用，方法同上	
第三袋药品服用时间：	视肠道准备情况：若符合标准，可不喝；若仍排出粪渣，继续服用第三袋，例图如右侧	 肠道准备差  肠道准备较差  肠道准备较好  肠道准备好
西甲硅油服用时间：	最后一袋泻药服用完后喝	 整瓶（30ml）全部倒出再兑50ml水饮用
 禁饮时间：	检查前至少禁饮2小时	检查前两小时需开始禁饮，提醒您如还没喝西甲硅油，记得在禁饮前喝掉

泻药服用方法：硫酸镁钠钾浓溶液

第一瓶药品服用时间：	检查前一日20:00	20:00-20:30：  + 水到500ml，半小时喝完 20:30-21:30：再喝1000ml无色澄清透明液体如水、椰青、脉动
第二瓶药品服用时间：	检查前4小时服用（方法同第一瓶）	检查前4小时服用：  + 水到500ml，半小时喝完 喝完兑好的500ml药液后连着喝，在1小时内再喝1000ml无色澄清透明液体如水、椰青、脉动  肠道准备差  肠道准备较差  肠道准备较好  肠道准备好
西甲硅油服用时间：	喝完早上的1500ml以后连着喝	 整瓶（30ml）全部倒出再兑50ml水饮用
 禁饮时间：	检查前至少禁饮2小时	检查前两小时需开始禁饮，提醒您如还没喝西甲硅油，记得在禁饮前喝掉

*服用过程中务必来回走动，同时顺时针按揉腹部，可咀嚼口香糖，加快肠蠕动，缓解腹胀、恶心、呕吐等不适。

*在服用泻药30-60分钟左右开始腹泻，可能腹泻10余次（腹泻时间及次数因人而异），留意大便的情况，若排出的大便仍有粪渣，在禁饮之前继续喝清水，直到排出的是清澈为止。如病情允许可多走动，促进排泄。

*如果有腹胀症状明显，可暂缓服用，待腹胀减轻后继续服用完毕。

*服用泻药期间，如出现腹痛、发烧、大便有血块等现象，请立即停止服用并告知医护人员。

6.陪同人员要求

麻醉检查者，须确保当日有一名成年的陪同人员，整个过程需要1-2小时，请提前安排。
在检查过程中,您会接受麻醉药物,可能会感到昏昏欲睡或不清醒,陪同人员将帮助您在术后恢复期间提供必要的支持,确保您顺利回家,如果有任何异常情况,陪同人员也能及时处理,确保您的健康得到保障。

7.检查当天的出行安排

麻醉检查者，检查后24小时不开车，请选择妥当的出行方法。

8.既往内镜报告

如您在外院做过胃肠镜，请携带上您的既往报告，交给内镜的工作人员，以便参考。

9.关于个人物品

为保障您的安全，请在到院接受检查前完全移除以下物品：隐形眼镜/首饰/指甲油
我们也建议您尽量不要携带大量现金或贵重物品，因为我们提供的储物柜空间较小。
如果您佩戴眼镜、假牙或助听器，请务必随身携带收纳盒，以便在检查过程中妥善存放。

10.女性客户

检查者应避开月经期，检查当日着宽松衣裤和平底鞋，若有美甲且无法测量血氧饱和度者，我们将会要求您卸掉一个手指的甲片。

11.关于息肉的处理

检查过程中医生将根据专业的判断，对发现的息肉或病变进行处理。若经检查医生评估，所发现的息肉或病变已无法在门诊处理，医生将会现场与家属沟通，商讨接下来的事宜。
若不同意处理，请在签署内镜检查同意书时告知

12.改约

如有感冒、发热、咳嗽咳痰请及时联系我们，经医生评估可能会为您改约，或者其他特殊情况需要改约，请提前一天的16点前联系我们

13.关于医保

我院已获取医保定点资质，门诊和住院均支持使用医保。
深圳医保一档：统筹报销55%（退休60%）；
深圳医保二档、居民医保：可使用家庭通道（使用授权人的个人账户）
异地医保报销比例按参保地政策执行，详情可咨询参保地医保局
如有商保或其他保险涉及报销，请提前告知所需资料，就诊时与工作人员说明。
实际价格以医院公示为准

14.内镜治疗费用

如果检查过程中需要进行活检、息肉切除或使用特殊耗材等治疗，可能会产生额外费用。这些额外项目的费用会根据治疗需求与实际使用另行计算，并在胃肠镜结束后收取。

- 收费标准：依据深圳市基本医疗服务价格
- 费用区间：出于切除干净和安全性考虑，医生会根据息肉大小、形态等选择合适的方式。如果息肉较小，使用活检钳钳除，通常在2000元以内；如果内镜下黏膜切除（EMR）等，收费范围在2000-5000元，或者更高。

常见治疗与息肉切除收费参考：

**依据深圳市基本医疗服务价格定价，耗材药品不同批次品牌有所差异，仅供参考*

**√为可能收费项目，具体数量按实际*

检查项目	收费项目	项目列表	活检钳息肉钳除术	冷圈套息肉切除术	热圈套息肉切除术	内镜下黏膜切除术(EMR)
胃镜	治疗费	经胃镜特殊治疗；500元/次	√	√	√	
		内镜下黏膜切除术(EMR)；1690/次				√
		电凝加收；100/次			√	
		电切加收；100/次			√	
		氩气刀加收；100/次			√	
	耗材费	活检钳；50-150元/个	√			
		圈套器；180-600/个		√	√	√
		止血夹；130-230/个		√	√	√
		中性电极；50-70元/个			√	√
		注射针；300-500/个				√
	药品费	0.9%生理盐水；3-8元/瓶				√
		亚甲蓝；12-20元/支				√
		病理费；184元/例	√	√	√	√
	病理费	病理费(加收)，40元/每个蜡块	√	√	√	√
肠镜	治疗费	经肠镜特殊治疗；800元/次	√	√	√	
		内镜下黏膜切除术(EMR)；1690/次				√
		电凝加收；100/次			√	
		电切加收；100/次			√	
		氩气刀加收；100/次			√	
	耗材费	活检钳；50-150元/个	√			
		圈套器；180-600/个		√	√	√
		止血夹；130-230/个		√	√	√
		中性电极；50-70元/个			√	√
		注射针；300-500/个				√
	药品费	0.9%生理盐水；3-8元/瓶				√
		亚甲蓝；12-20元/支				√
		病理费；184元/例	√	√	√	√
	病理费	病理费(加收)，40元/每个蜡块	√	√	√	√

您的内镜检查之旅

**请您按照约定时间提前到达，迟到可能会导致您的检查时间推迟。
整个过程需要大约1~2小时，因不可预测原因或客观因素，有可能导致等候检查时间过长，敬请谅解，请您提前做好安排。

- 1


报到

前台工作人员会请您出示您的身份证，核对您的身份信息和预约信息，并为您佩戴手腕带。随后，会进行简单的评估以确保您的 准备符合检查要求，并请您填写知情同意书。


- 2

准备

报到后，您需要更换医院提供的检查服或肠镜裤。随后，我们会让您躺在检查床上，在您的手臂上建立静脉通道，穿刺后针头会被移除，仅保留一根细软的输液管。护士会向您了解健康状况，同时让您含服一种局部麻醉药。当一切准备就绪后，我们会带您前往检查室，并请您左侧卧位躺好，


- 3

内镜检查

工作人员会将您推至诊疗间，诊疗间会有内镜医生、麻醉医生与内镜护士。胃镜检查会给您的嘴巴佩戴一个咬口，确保您的口腔张开。麻醉的内镜检查过程中，您会睡着，所以不会有什么感觉。


- 4

复苏

麻醉检查者检查完成后，您会被安排在复苏室休息。护士会监测您的情况，直到您符合离开的条件。工作人员会引导您更衣离开，前往前台咨询内镜的结果。


- 5

报告及注意事项

检查后会将报告会上传到您的电子病历，在医院小程序可以查询。如果您想要纸质版的报告，可以去前台打印。检查过程中如有活检或治疗或为您开具药品，需要您额外缴费。病理报告可以在检查后3-5工作日查询到。



检查后注意事项

1.关于缴费

如您取了活检或进行了息肉切除，需要缴纳产生的治疗费用、耗材费用以及病理费用。

缴费途径 缴费类型	自助机	1楼财务中心	手机小程序
深圳医保	√	√	√
异地医保		√	
自费	√	√	√

2.关于取药

如检查后医生有为您开具口服药，缴费后请到1楼药房窗口取药。

3.关于检查后注意事项

①饮食与运动指导

请查看您的内镜报告，按照医生的建议执行。
如没有特殊治疗，一般在术后2小时后可少量饮水，以确认没有呛咳等不良反应。

②检查后观察要点，如不适及时就诊：

（非工作时间可前往我院急诊，工作时间可挂号消化内科）

- 严重的腹痛、腹胀、呕吐
- 发热
- 黑便

③什么是流质饮食、半流质/软食？

- 流食：水、过滤的肉汤/菜汤、过滤的果汁、牛奶、豆浆、米汤、稀藕粉等
- 半流食/软食：粥、米糊、藕粉、肉泥、果泥、烂面条、蒸水蛋、豆腐等

4.关于麻醉后注意事项

麻醉结束后的一段时间内，您可能存在意识不到的判断和反应能力减退。在结束后24小时内，鉴于您的状态欠佳，请注意**不要**做以下事项：

- ✗ 开车或骑自行车
- ✗ 饮酒
- ✗ 签署有法律效应的文件
- ✗ 作重要决定
- ✗ 操作机械
- ✗ 服用催眠药物
- ✗ 锻炼身体

5.检查后可能产生的不适




1.咽部疼痛或声音嘶哑：可能由内镜通过咽喉部摩擦引起，通常2-3天可自行缓解或可含服薄荷片、喉片等缓解不适。



2.腹痛腹胀：多见于肠镜检查时注气扩张肠腔引起，可边走动边顺时针揉肚子或如厕排便来促进排气，排气后多可缓解。




3.恶心呕吐：多见于胃镜检查后咽喉刺激或是麻醉药物的残余作用，多数情况下数小时可自行缓解。



4.肛门不适：肠镜检查后，可能会出现肛门坠胀感，多数情况下数小时可自行缓解。

6.关于病理

- 病理结果一般在检查完成后3-5个工作日出具
- 查询方法： 深圳前海泰康医院小程序（下图），首页-查报告单



- 进一步咨询或诊治：请到消化内科门诊复诊

如何联系我们



联系电话：40001-95522转6（提供周一到周日24小时人工服务）



联系地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 3099号
深圳前海泰康医院门诊4楼



地铁出行：5号线前湾公园站A口



自驾导航：深圳前海泰康医院门诊（南门）
深圳前海泰康医院急诊（北门）



联系微信：内镜小助手



工作时间：周一至周五 8:00~12:00,13:00~17:00
周末 8:00~12:00,13:00~17:00（周末仅提供咨询及预约、取药服务，不开展胃肠镜检查）

就诊线路图



尊重生命 关爱生命 礼赞生命

咨询：40001-95522转6

地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道3009号

公共交通：地铁5号线-前湾公园A出口



扫一扫
预约挂号 关注资讯

本手册仅用于健康教育目的，不能替代专业的医学诊断或治疗。如您对自身健康状况有任何疑问，或在开始任何治疗前，请咨询专业医疗人员。

启用日期：2025年6月17日

编写人员：刘畅、彭怡婷，深圳前海泰康医院内镜中心

版权所有：未经深圳前海泰康医院许可，不得复制、传播或修改本资料。