

消化內鏡 服務手冊

Endoscopy Center

電話：40001-95522轉6

地址：深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道3099號
深圳前海泰康醫院門診4樓消化內鏡中心

消化病學診療中心



深圳前海泰康醫院消化病學中心是泰康醫療的戰略型重點學科，由我國著名消化病學專家、第十一屆中華醫學會消化病學分會主任委員陳旻湖院長領銜，彙聚消化內科陳其奎教授、消化內鏡李初俊教授、肝膽外科周傑教授、消化病理焦宇飛教授等知名專家，打造多學科合作、特色化、醫教研一體的消化疾病診療中心。

中心在對常見消化系統疾病的診斷和治療基礎上，合作各科室重點發展炎症性腸病（IBD）全病程管理、胃腸道疾病內鏡治療、肝膽胰腺疾病診治、消化系統常見腫瘤早篩早治、胃腸道腫瘤微創治療、腸道菌群檢測與菌群移植等特色診療項目。

ENDOSCOPY CENTER

深圳前海泰康醫院 消化內鏡



我們專注於消化內鏡專業診療服務，致力於為客戶提供高質量、全方比特的健康醫療保障。中心配備了國際領先的奧林巴斯290、富士6000、以及一次性胃腸鏡設備。開展無痛胃鏡、腸鏡、超聲內鏡、小腸鏡等多種內鏡檢查和治療手段。

我們以“提供安全、專業、舒適的高品質內鏡診療”為宗旨，通過高效的流程和便捷的服務，為客戶提供無憂的內鏡診療。



關於舒適內鏡

內鏡中心提供多種無痛內鏡科技，麻醉由專業麻醉師負責，確保整個檢查過程中的舒適無痛。注重隱私和舒適，從溫馨的候診環境到個性化的服務，確保客戶在整個就診過程中的舒適體驗。

為什麼選擇我們？

- ✓ 先進的內鏡設備
- ✓ 方便快捷的預約通路和週期舒適的診療環境
- ✓ 遵循國際標準的消毒和感染控制流程
- ✓ 資深的消化內鏡、麻醉、病理多學科團隊

目錄

❶ 什麼是胃鏡和腸鏡？	1
❷ 消化內鏡醫生簡介	2
❸ 胃腸鏡預約流程	3
❹ 預約就診須知	4
❺ 胃腸鏡檢查須知	6
❻ 您的內鏡之旅	10
❼ 檢查後注意事項	11
❽ 如何聯繫我們	13

什麼是胃鏡和腸鏡？

1.胃鏡：

醫生將使用一個被稱為內窺鏡的細軟管從口腔進入，它帶有自備的鏡頭和光源，醫生可以在視頻顯示器上觀看實時的影像來檢查您消化道上部的內壁，包括食管、胃和十二指腸（小腸的第一部分）。

胃鏡檢查的目的：胃鏡檢查幫助您的醫生評估上腹部疼痛、噁心、嘔吐或吞咽困難等症狀。這是尋找上消化道出血原因的最好的檢查方法。它比X光片能更準確地發現食管、胃和十二指腸中的炎症、潰瘍和腫瘤。您的醫生可能利用胃鏡檢查獲取活檢樣本（小塊組織樣本）來明確診斷。

2.腸鏡：

內窺鏡原理同胃鏡，腸鏡從肛門進入，是另一條乾淨的內窺鏡。從肛門進入後，再慢慢進入直腸和結腸部分，醫生將對您的整個大腸內壁進行觀察。

腸鏡檢查的目的：結腸鏡檢查可以被推薦作為大腸癌篩查的一個項目。近年來，隨著中國生活水準的提升和飲食習慣的西化，結直腸癌的發病率呈現上升趨勢，已成為消化系統中發病率第二比特、患病率第一位的惡性腫瘤。通過早期篩查和干預，可以顯著降低發病率和死亡率。您的醫生也可能推薦結腸鏡檢查用於評估出血、慢性腹瀉等症狀。

活檢示例圖



消化內鏡醫生簡介



李初俊-消化內鏡首席專家

出診時間：週二下午（專家門診）、週三下午（國療門診）

個人簡介：長期從事臨床工作，對消化系統疾病，包括食管、胃腸以及肝膽、胰腺疾患的臨床和消化內鏡下的診斷與治療具有豐富的經驗。曾創立並歷任中山大學附屬第六醫院消化內鏡科主任、消化內科主任和診療學教研室主任；曾於香港中文大學研修現代治療內鏡，近20多年來專注於消化內鏡工作，消化內鏡診療科技全面，嫻熟地操作各種消化內鏡（包括胃鏡、腸鏡、小腸鏡、十二指腸鏡、超聲內鏡、無線/膠囊內鏡）進行各種消化內鏡診斷，並擅長於不需開胸、開腹手術的各種消化內鏡下的超微創治療，包括消化道息肉、胃腸道黏膜下腫瘤、早期消化道癌、消化道出血、內痔、賁門失弛緩等消化道狹窄或梗阻性病變、膽總管結石、闌尾結石的超微創治療、各種消化道支架和膽胰管支架的置放、超聲內鏡引導下的穿刺活檢及引流等，於有效治療的同時，最大限度減少治療創傷。

擅長：胃腸息肉、胃腸道黏膜下腫瘤、早期消化道癌、消化道出血、內痔、消化道或膽胰管狹窄或梗阻、賁門失弛緩症、膽總管結石、胰腺假性囊腫、闌尾炎/闌尾結石。



王琛-消化內科主任醫師

出診時間：週一下午（專家門診）、週四下午（專科門診）

個人簡介：內蒙古醫科大學消化內科碩士，長期研究消化系統疾病飲食與生活指導。獲市級科技進步獎三等獎，參與發表SCI論文9篇，論著1部。參與省級科研課題6項。擁有17年臨床診療經驗，多次赴國內外頂尖醫療機構深造消化內科及消化內鏡科技，完成全科醫師培訓及精神心理科轉崗培訓，參與多項腸道微生態研究專案。

擅長：功能性便秘、腹瀉、腸易激綜合征（IBS）及腸道菌群失調引發的免疫疾病等消化疾病診治，及超聲內鏡、胃腸鏡早癌篩查、消化道息肉內鏡下微創治療。致致力於探索腸-腦-免疫軸在消化道疾病、過敏性疾病中的作用，擅長結合多學科視角開展綜合診療。



孫廷基-消化內科主治醫師

出診時間：週三下午（專科門診）

個人簡介：長期從事消化內鏡診療與研究，可完成消化道早期腫瘤內鏡下診斷及切除治療、消化道息肉的內鏡下切除，急性消化道出血內鏡下治療、消化道異物取出術、超聲內鏡檢查等內鏡科技；曾在上海長海醫院、中山大學附屬第一醫院進修內鏡科技。

擅長：慢性胃炎診斷及治療、消化道息肉內鏡下切除、消化道早期腫瘤內鏡下切除、急性消化道出血（包括靜脈曲張性及非靜脈曲張性）內鏡下治療、消化道異物取出、膽胰相關疾病。

消化內鏡預約流程（門診）

*適用於非國際部客戶

1.消化內科門診

門診2樓：內外科綜合門診/專家門診

*途徑：醫院公眾號或自助繳費機



2.麻醉門診

門診4樓：麻醉評估門診

*如預約普通胃腸鏡，請繳費後直接前往內鏡中心*非工作日
工作時間僅提供線上麻醉預評估服務。由於線上評估存在
一定局限性，無法替代現場評估，因此最終能否接受無痛
檢查仍需以檢查當天的現場評估結果為準。



3.繳費

*途徑：醫院公眾號或自助繳費機

*共兩筆費用：胃腸鏡相關費用，麻醉相關費用
（如為普通胃腸鏡，則無需麻醉費用）*費用詳
情請參攷第4頁



4.取藥

門診4樓：內鏡中心

*提供胃腸鏡健康宣教及預約諮詢。



預約就診須知

如您有以下情況，請在預約時及時告知醫生

- 有心臟起搏器
- 有植入式心臟除顫器
- 長期服用抗血小板藥物或抗凝藥物如阿司匹林、氯吡格雷（波立維）、華法林等
- 長期便秘
- 有造口
- 懷孕或可能懷孕

1. 不接受指定檢查醫生，若需指定醫生，請到該醫生門診掛號時與醫生本人溝通安排。
2. 如同時預約腹部B超、影像檢查，請完成檢查後再行胃腸鏡檢查。 如同時預約鉬餐造影，則胃鏡檢查需延后3天。
3. 為了保障檢查安全，強烈建議患者本人按預約流程親自前來完成麻醉評估後再取藥。
若由他人代為取藥，可能導致“先服藥、後評估”的情況，存在腸道已準備好但麻醉評估未通過、無法進行無痛檢查的風險。 儘管現時已提供線上麻醉預評估服務，但醫生無法通過遠程管道進行面診、聽診及結合部分輔助檢查（如心電圖、心臟彩超、24小時睡眠呼吸監測等）做出完整判斷。 最終是否符合無痛內鏡檢查條件，仍需以現場麻醉評估為準。
4. 若麻醉評估未通過，將無法安排無痛檢查，需根據具體情況改約檢查時間、退費或改為清醒內鏡檢查，敬請理解與配合。
5. 如有商保或其他保險涉及報帳，請提前告知所需資料，請就診時與醫生說明。
6. 本院僅提供病歷、清單及發票，若有保單涉及到其他額外的資料，請您先與保險公司確定所需的資料，在就診時進行說明。
7. 我院已獲取醫保定點資質，門診和住院均支持使用醫保。 异地醫保報帳比例按參保地政策執行，詳情可諮詢參保地醫保局。
8. 胃腸鏡檢查費用*（按照深圳醫保定價收費，具體價格以醫院公示為準，僅供參考）

檢查項目	費用（ 檢查費加藥品 ）
普通胃腸鏡	800~1000元
麻醉胃腸鏡	1200~1600元

*所列費用僅檢查費及檢查用常規藥品，不包含看診的掛號費以及檢查過程中所做的活檢或者治療（如息肉切除等）所產生的治療費、耗材費及病理費（費用詳情請參攷第8頁）。

根據醫生評估個人情況用藥可能有所不同，或有特殊用藥情況，費用將會在此基礎上有波動。

*國際部客戶、VIP客戶不適用

1.9.風險告知任何醫療行為都存在一定風險，消化內鏡檢查與治療是一種侵入人體的檢查與治療方法，在檢查與治療過程中可能會對人體帶來一定的損傷，麻醉同樣如此，尤其對於伴有基礎疾病或高齡患者而言，以下是關於消化內鏡和麻醉的風險告知，檢查前會請您簽署知情同意書，請您知曉瞭解。

消化內鏡檢查風險告知

I. 消化內鏡檢查及內鏡下治療有一定的創傷性和危險性，在實施過程中/後可能出現下列併發症和風險：

- | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| (1) 咽喉不適或損傷 | (2) 噁心嘔吐 | (3) 原鬆動牙齒脫落 |
| (4) 腹痛 | (5) 腹脹 | (6) 誘發出血或原出血加重 |
| (7) 穿孔 | (8) 虛脫、低血糖 | (9) 原有腸梗阻加重 |
| (10) 在腸道準備過程中發生水、電解質紊亂 | | |
| (11) 誘發急性心血管意外：包括急性心律失常、急性心肌梗死 | | |
| (12) 誘發腦血管意外 | (13) 治療時病灶附近臟器損傷 | |
| (14) 檢查及（或）治療失敗 | (15) 感染 | |
| (16) 誘發高澱粉酶血症或急性胰腺炎等 | (17) 其他 | |

II. 如果患有高血壓、心臟病、糖尿病、肝腎功能不全、靜脈血栓等疾病或者有吸煙史以上這些風險可能會加大，或者在檢查中或檢查後出現相關的病情加重或心腦血管意外，甚至死亡。

麻醉風險告知

(1) 根據麻醉操作規範、按照《中華人民共和國藥典》的要求，使用各種、各類麻醉藥後，患者仍有可能出現中毒、過敏、高敏、神經毒性等反應，導致休克、呼吸心跳停止。

(2) 全麻時，特別是對急症飽胃患者，麻醉前已經採取力所能及的預防措施，但仍不能完全避免發生嘔吐、反流誤吸，甚至窒息死亡。

(3) 全身麻醉可引起喉或支氣管痙攣、呼吸道梗阻、呼吸抑制等。

(4) 麻醉過程中，有可能出現心腦血管系統併發症：血壓異常波動、心律失常、心力衰竭和休克等。

(5) 氣管插管、喉罩置入過程中，雖按常規操作，仍可能發生牙齒脫落，口、鼻、唇、咽喉部損傷，氣道痙攣等不良後果。


(6) 患者本身合併其他疾病或有重要臟器損害者，相關併發症和麻醉危險性顯著增加。

(7) 常規檢查和治療可能引起的併發症。

(8) 其它

胃腸鏡檢查須知

1.飲食準備： 【檢查前一日】

 低纖維的食物 ✓ 白面包、白粥、白米飯猪 ✓ 肉、鱼肉、雞肉 ✓ 雞蛋、豆腐 	 高纖維、帶籽的食物 ✗ 堅果、爆米花、藜麥、燕麥、全麥食物 ✗ 西瓜、奇異果、火龙果、蕃茄等 ✗ 青菜、鳳梨、韭菜、竹筍 
---	---

【檢查前最後一餐】

建議清流質飲食，如：

無渣鮮果汁（檸檬汁、梨汁、蘋果汁）、煮水果汁/米湯、稀藕粉、稀麵湯/無渣肉湯、雞湯、魚湯/過濾菜湯等

2.禁食禁飲的時間要求

禁食至少6小時，禁飲至少2小時，請嚴格按照醫護人員指導進行

（如有胃排空相關疾病或影響因素可能會新增禁食禁飲時間，以醫生建議為準）

常規情況下：

早上檢查者會要求您前一日晚餐後（八點）開始禁食

下午檢查者會要求您檢查當日早餐後（七點）開始禁食

3.特殊藥物注意

抗凝、抗血小板及活血化瘀藥物：請在醫生指導下停用，常規停用5-7天

降壓藥：檢查當天，請在醫生指導下服用 ✓

降糖藥：檢查當天，請在醫生指導下停用 ✗

4.瀉藥服用方法

現時本院使用的瀉藥有兩種（下圖），根據醫生所開藥品，您會得到相對應的指導，請嚴格遵守醫護人員所宣教的內容，若有特殊情况：如嚴格遵守喝藥方法後排便情況依舊不理想，請及時聯系檢查部門進行說明以及得到指導，但您的檢查時間可能會有改動。





瀉藥1：聚乙二醇電解質散





瀉藥2：硫酸鎂鈉鉀濃溶液

瀉藥服用方法：聚乙二醇電解質散

第一袋藥品服用時間：	檢查前6小時服用，每隔15分鐘喝250ml，1小時內飲完1000ml	 每一袋聚乙二醇電解質散都要配實1000ml水飲用，或可選擇兌脈動等無色澄清透明液體
第二袋藥品服用時間：	檢查前5小時服用，方法同上	
第三袋藥品服用時間：	視腸道準備情況：若符合標準，可不喝；若仍排出糞渣，繼續服用第三袋，例圖如右側	
西甲矽油服用時間：	最後一袋瀉藥服用完後喝	 整瓶（30ml）全部倒出再兌50ml水飲用
 禁飲時間：	檢查前至少禁飲2小時	檢查前兩小時需開始禁飲，提醒您如還沒喝西甲矽油，記得在禁飲前喝掉

瀉藥服用方法：硫酸鎂鈉鉀濃溶液

第一瓶藥品服用時間：	檢查前一日20:00	20:00-20:30：  + 水到500ml，半小時喝完 20:30-21:30：再喝1000ml無色澄清透明液體如水、椰青、脈動
第二瓶藥品服用時間：	檢查前4小時服用（方法同第一瓶）	檢查前4小時服用：  + 水到500ml，半小時喝完 喝完兌好的500ml藥液後連著喝，在1小時內再喝1000ml無色澄清透明液體如水、椰青、脈動 
西甲矽油服用時間：	喝完早上的1500ml以後連著喝	 整瓶（30ml）全部倒出再兌50ml水飲用
 禁飲時間：	檢查前至少禁飲2小時	檢查前兩小時需開始禁飲，提醒您如還沒喝西甲矽油，記得在禁飲前喝掉

*服用過程中務必來回走動，同時順時針按揉腹部，可咀嚼口香糖，加快腸蠕動，緩解腹脹、惡心、嘔吐等不適。

*在服用瀉藥30-60分鐘左右開始腹瀉，可能腹瀉10餘次（腹瀉時間及次數因人而異），留意大便的情況，若排出的大便仍有糞渣，在禁飲之前繼續喝清水，直到排出的是清澈為止。如病情允許可多走動，促進排泄。

*如果有腹脹症狀明顯，可暫緩服用，待腹脹減輕後繼續服用完畢。

*服用瀉藥期間，如出現腹痛、發燒、大便有血塊等現象，請立即停止服用並告知醫護人員。

6. 陪同人員要求

麻醉檢查者，須確保當日有一名成年的陪同人員，整個過程需要1-2小時，請提前安排。

在檢查過程中，您會接受麻醉藥物，可能會感到昏昏欲睡或不清醒，陪同人員將幫助您在術後恢復期間提供必要的支持，確保您順利回家，如果有任何異常情況，陪同人員也能及時處理，確保您的健康得到保障。

7. 檢查當天的出行安排

麻醉檢查者，檢查後24小時不開車，請選擇妥當的出行方法。

8. 既往內鏡報告

如您在外院做過胃腸鏡，請攜帶上您的既往報告，交給內鏡的工作人員，以便參攷。

9. 關於個人物品

為保障您的安全，請在到院接受檢查前完全移除以下物品：隱形眼鏡/首飾/指甲油我們也建議您儘量不要攜帶大量現金或貴重物品，因為我們提供的儲物櫃空間較小。

如果您佩戴眼鏡、假牙或助聽器，請務必隨身攜帶收納盒，以便在檢查過程中妥善存放。

10. 女性客戶

檢查者應避開月經期，檢查當日著寬鬆衣褲和平底鞋，若有美甲且無法量測血氧飽和度者，我們將會要求您卸掉一個手指的甲片。

11. 關於息肉的處理

檢查過程中醫生將根據專業的判斷，對發現的息肉或病變進行處理。若經檢查醫生評估，所發現的息肉或病變已無法在門診處理，醫生將會現場與家屬溝通，商討接下來的事宜。

若不同意處理，請在簽署內鏡檢查同意書時告知

12. 改約

如有感冒、發熱、咳嗽咳痰請及時聯繫我們，經醫生評估可能會為您改約，或者其他特殊情況需要改約，請提前一天的16點前聯繫我們

13. 關於醫保

我院已獲取醫保定點資質，門診和住院均支持使用醫保。

深圳醫保一檔：統籌報帳55%（退休60%）；

深圳醫保二檔、居民醫保：可使用家庭通道（使用授權人的個人帳戶）

异地醫保報帳比例按參保地政策執行，詳情可諮詢參保地醫保局

如有商保或其他保險涉及報帳，請提前告知所需資料，就診時與工作人員說明。

實際價格以醫院公示為準

14. 內鏡治療費用（*該價格不適用國際醫療客戶及VIP客戶）

如果檢查過程中需要進行活檢、息肉切除或使用特殊耗材等治療，可能會產生額外費用。這些額外項目的費用會根據治療需求與實際使用另行計算，並在胃腸鏡結束後收取。

- 收費標準：依據深圳市基本醫療服務價格
- 費用區間：出於切除乾淨和安全性考慮，醫生會根據息肉大小、形態等選擇合適的管道。如果息肉較小，使用活檢鉗鉗除，通常在2000元以內；如果內鏡下黏膜切除（EMR）等，收費範圍在2000-5000元，或者更高。

常見治療與息肉切除收費參攷（該價格**不適用**國際醫療部客戶）：

依據深圳市基本醫療服務價格定價，耗材藥品不同批次品牌有所差異，僅供參考✓為可能收費項目，具體數量按實際

檢查項目	收費項目	項目清單	活檢鉗息肉鉗除術	冷圈套息肉切除術	熱圈套息肉切除術	內鏡下黏膜切除術（EMR）
胃鏡	治療費	經胃鏡特殊治療； 500元/次	✓	✓	✓	
		內鏡下黏膜切除術（EMR）； 1690/次				✓
		電凝加收； 100/次			✓	
		電切加收； 100/次			✓	
		氬氣刀加收； 100/次			✓	
	耗材費	活檢鉗； 50-150元/個	✓			
		圈套器； 180-600/個		✓	✓	✓
		止血夾； 130-230/個		✓	✓	✓
		中性電極； 50-70元/個			✓	✓
		注射針； 300-500/個				✓
	藥品費	0.9%生理鹽水； 3-8元/瓶				✓
		亞甲藍； 12-20元/支				✓
	病理費	病理費； 184元/例	✓	✓	✓	✓
		病理費（加收）， 40元/每個蠟塊	✓	✓	✓	✓
腸鏡	治療費	經腸鏡特殊治療； 800元/次	✓	✓	✓	
		內鏡下黏膜切除術（EMR）； 1690/次				✓
		電凝加收； 100/次			✓	
		電切加收； 100/次			✓	
		氬氣刀加收； 100/次			✓	
	耗材費	活檢鉗； 50-150元/個	✓			
		圈套器； 180-600/個		✓	✓	✓
		止血夾； 130-230/個		✓	✓	✓
		中性電極； 50-70元/個			✓	✓
		注射針； 300-500/個				✓
	藥品費	0.9%生理鹽水； 3-8元/瓶				✓
		亞甲藍； 12-20元/支				✓
	病理費	病理費； 184元/例	✓	✓	✓	✓
		病理費（加收）， 40元/每個蠟塊	✓	✓	✓	✓

您的內鏡檢查之旅

**請您按照約定時間提前到達，遲到可能會導致您的檢查時間推遲。
整個過程需要大約1~2小時，因不可預測原因或客觀因素，有可能導致等候檢查時間過長，敬請諒解，請您提前做好安排。

- 1


報到

前臺工作人員會請您出示您的身份證，核對您的身份資訊和預約資訊，並為您佩戴手腕帶。隨後，會進行簡單的評估以確保您的準備符合檢查要求，並請您填寫知情同意書。


- 2

準備

報到後，您需要更換醫院提供的檢查服或腸鏡褲。隨後，我們會讓您躺在檢查床上，在您的手臂上建立靜脈通道，穿刺後針頭會被移除，僅保留一根細軟的輸液管。護士會向您瞭解健康狀況，同時讓您含服一種局部麻醉藥。當一切準備就緒後，我們會帶您前往檢查室，並請您左側臥比特躺好，


- 3

內鏡檢查

工作人員會將您推至診療間，診療間會有內鏡醫生、麻醉醫生與內鏡護士。胃鏡檢查會給您的嘴巴佩戴一個咬口，確保您的口腔張開。麻醉的內鏡檢查過程中，您會睡著，所以不會有什麼感覺。


- 4

復蘇

麻醉檢查者檢查完成後，您會被安排在復蘇室休息。護士會監測您的情況，直到您符合離開的條件。工作人員會引導您更衣離開，前往前臺諮詢內鏡的結果。


- 5

報告及注意事項

檢查後會將報告會上傳到您的電子病歷，在醫院小程序可以查詢。如果您想要紙質版的報告，可以去前臺列印。檢查過程中如有活檢或治療或為您開具藥品，需要您額外繳費。病理報告可以在檢查後3-5工作日查詢到。



檢查後注意事項

1.關於繳費

如您取了活檢或進行了息肉切除，需要繳納產生的治療費用、耗材費用以及病理費用。

繳費類型 \ 繳費途徑	自助機	1樓財務中心	手機小程序
深圳醫保	✓	✓	✓
异地醫保		✓	
自費	✓	✓	✓

2.關於取藥

如檢查後醫生有為您開具口服藥，繳費後請到1樓藥房視窗取藥。

3.關於檢查後注意事項

①飲食與運動指導

請查看您的內鏡報告，按照醫生的建議執行。
如沒有特殊治療，一般在術後2小時後可少量飲水，以確認沒有噎咳等不良反應。

②檢查後觀察要點，如不適及時就診： (非工作時間可前往我院急診，工作時間可掛號消化內科)

- 嚴重的腹痛、腹脹、嘔吐
- 發熱
- 黑便

③什麼是流質飲食、半流質/軟食？

- 流食：水、過濾的肉湯/菜湯、過濾的果汁、牛奶、豆漿、米湯、稀藕粉等
- 半流食/軟食：粥、米糊、藕粉、肉泥、果泥、爛麵條、蒸水蛋、豆腐等

4.關於麻醉後注意事項

麻醉結束後的一段時間內，您可能存在意識不到的判斷和反應能力減退。 在結束後24小時內，介於您的狀態欠佳，請注意不要做以下事項：

- ✕ • 開車或騎自行車

✕ • 飲酒

✕ • 簽署有法律效應的檔案
- ✕ • 作重要決定

✕ • 操作機械

✕ • 服用催眠藥物

✕ • 鍛煉身體

5. 檢查後可能產生的不適



1. 咽部疼痛或聲音嘶啞：可能由內鏡通過咽喉部摩擦引起，通常2-3天可自行緩解或可含服薄荷片、喉片等緩解不適。



2. 腹痛腹脹：多見於腸鏡檢查時注氣擴張腸腔引起，可邊走動邊順時針揉肚子或如廁排便來促進排氣，排氣後多可緩解。





3. 噁心嘔吐：多見於胃鏡檢查後咽喉刺激或是麻醉藥物的殘餘作用，多數情況下數小時可自行緩解。



4. 肛門不適：腸鏡檢查後，可能會出現肛門墜漲感，多數情況下數小時可自行緩解。

6. 關於病理

- 病理結果一般在檢查完成後3-5個工作日出具
- 查詢方法：深圳前海泰康醫院小程序（下圖），首頁-查報告單



- 進一步諮詢或診治：請到消化內科門診複診

如何聯繫我們



聯繫電話：40001-95522轉6（提供週一到周日24小時人工服務）



聯繫地址：深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道3099號
深圳前海泰康醫院門診4樓



捷運出行：5號線前灣公園站A口



自駕導航：深圳前海泰康醫院門診（南門）
深圳前海泰康醫院急診（北門）



聯系微信：內鏡小助手



工作時間：週一至週五8:00~12:00,13:00~17:00
週末8:00~12:00,13:00~17:00（週末僅提供諮詢及預約、取藥服務，不開展胃腸鏡檢查）

就診線路圖



尊重生命 關愛生命 禮贊生命

諮詢：40001-95522轉6

地址：深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道3009號

公共交通：捷運5號線-前灣公園A出口



掃一掃預約掛號關注資訊

本手冊僅用於健康教育目的，不能替代專業的醫學診斷或治療。如您對自身健康狀況有任何疑問，或在開始任何治療前，請諮詢專業醫療人員。

啟用日期：2025年6月17日編寫人員：劉暢、彭怡婷

深圳前海泰康醫院內鏡中心版權所有：未經深圳前海泰康醫院許可，不得複製、傳播或修改本資料。